

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部  
普濟方卷三百十一

詳校官太醫院醫士<sub>臣</sub>程泰

編修<sub>臣</sub>倉聖脈覆勘

總校官進士<sub>臣</sub>楊懋珩

校對官中書<sub>臣</sub>金光悌

謄錄監生<sub>臣</sub>黃廷璧

欽定四庫全書卷

普濟方卷三百十一

明周王朱橚撰

折傷門

傷折疼痛

附論

凡筋骨傷折疼痛人之一身血榮氣衛循環無窮或筋肉骨節誤致傷折則血氣瘀滯疼痛倉卒之間失於調理所傷不得完所折不得續輕者肌膚焮腫重者髀臼挫脫治法宜先整其骨折之所然後施貼燭封裏之藥

方

麒麟竭散

出聖濟  
總錄

治筋骨損傷疼痛

麒麟竭

沒藥

研

自然銅

煨醋淬  
七次研

赤芍藥

當歸

切焙

香白芷

蒲黃

大黃

生用各  
半兩

桂

去粗

皮

細辛

去苗葉  
各一兩

骨碎補

去毛炒  
二兩

乾荷葉

三分

右為散每服二錢溫酒調下不拘時候

附子散

出聖  
惠方

治一切傷折疼痛不可忍

附子

炮裂去  
皮臍

當歸

剉微  
煨

芎藭

桂心

沒藥

澤蘭 亂髮灰 櫟榔各一兩 敗龜塗酥炙黃 虎

脛骨塗酥炙微黃各二兩 甘草半兩炙微赤剉 麝香一分細研

右為細末入麝香研令勻不拘時候以溫酒調下二

錢

桃仁散出聖惠方 治傷折疼痛接骨止痛

桃仁湯浸去皮尖及雙仁者麤炒微黃 桂心 當歸剉微炒 元

胡索 生乾地黄 芎藭各一兩 川大黃剉研微炒

阿膠搗碎炒令黃燥各二兩 亂髮如鴨子大 川椒半兩去目及閉口者

微炒  
出汗

右為細末用酒二升先煎髮并阿膠如糖用綿濾去  
滓然後下諸藥末調勻焙乾搗細為散每服以溫酒  
調下二錢日三四服效

趁痛散

出德生堂

治男女跌傷疼痛不可忍者

草烏

炮裂碎別  
炒入藥

白芷

川芎

各一兩  
半

杜當歸

二兩

杜烏藥

五兩

乳香

半兩

紫金皮

大塊童子小  
便浸春夏三

日秋冬五  
日用半斤

沒藥

半兩

天南星

半斤

右為細末每服二錢或半錢溫酒調下病在上食後服病在下食前服

當歸散

出聖惠方

治傷折疼痛青腫血滯

當歸

剉微炒

桂心

桃仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

川大

黃

剉碎微炒

赤芍藥

各一兩

敗蒲

二兩燒灰

沒藥骨

碎補

各一兩半

右為細末每服以溫酒調下二錢日三四服

桂附散

出御藥院

治因傷損後筋骨疼痛

桂

去粗皮

附子

去皮臍生

白礬

細辛

去苗葉

五加

皮

白芷

桑葉

各二兩

右為散每服二兩入連根葱白十莖水一斗煎四五

沸淋洗立效

地黃金粉煎

出聖惠方

治傷折筋骨後疼痛不止宜服散

瘀血理折傷續筋骨止疼痛

生地黃

三斤淨洗令乾却入酒內浸二宿復取出紙袋盛火焙令乾為度

天雄

二兩炮裂去皮臍

桂心

當歸 芎藭

桃仁

湯浸去皮尖雙



仁微炒  
各一兩

右為末入金粉內和令勻用酒一斗以文武火煎成稠膏每日空心午前夜卧時各以酒調一匙溫服之

當歸血竭散

出聖惠方

治傷折筋骨疼痛不可忍

麒麟竭

別研

沒藥

另研

當歸

赤芍藥

桂

各一兩

白芷

一兩

右為細末每服二錢用溫酒調下不拘時候

應病丸

出醫方大成

治傷折後為血氣所侵手足痛疼

破故紙

一斤半炒一半

生蒼朮

一斤

骨碎補

一斤去毛

舶

上茴香

十二兩炒

穿山甲

去膜皮炒焦為度紫色亦可

生草烏

一斤劉如麥大

右除草烏一斤用生葱連皮生薑各二斤搗爛草烏

一處淹兩宿焙乾連前藥一處為末酒煮麴糊丸如

梧桐子大每服五十丸酒湯任下忌熱物

內固接骨丹

出聖惠方

治傷折疼痛

古字錢

二兩先於火內燒令通赤醋淬如此十度

自然銅

硫黃

各一

兩

以上三味為末入車瓶子內以坯子泥封固瓶口候乾倒下於火燒令通赤候冷取出搗羅入水銀一兩同研水銀星盡後用白薄紙裹藥似毬子後以泥入白內滴水爛搗裹藥毬入糠火內燒七日冷了出之細研入後

硃砂末 麝香末 犀角末

各一分

右研令勻搗生地黄絞取汁於銀器中熬為膏和藥

末丸如酸棗大如有患病者以溫酒半盞入地黃膏  
一錢攪勻下藥一粒服了如吐清綠水或瀉清綠水  
二三合勿怪是病出也宜頻服好瘥為度

接骨如神散 治傷骨損折疼痛者

水蛭

糯米炒  
黃去米

白綿

燒灰

沒藥

別研

乳香

別研各  
等分

血餘

小兒胎髮十五團燒  
灰如無童子髮亦可

右為末五十以上服一錢二十以下服半錢小兒服

半字溫酒調下

接骨散

出聖惠方

治傷折疼痛

粟黃

一斤曬乾

雄黃

半升

沒藥

二兩

麝香

半兩研極

細

桑根白皮

一斤剉

右為散每服三錢以醋一中盞煎至半盞用漿水二

合調服不過三服疼痛即止

筋骨藥 治一切疼痛及諸風

川烏

一箇

草烏

二兩去皮生用

乳香

當歸

天麻

各半

兩

虎骨

醋炙

沒藥

自然銅

芍藥

川芎

革辭

獨活

各一兩

右為末酒打麩糊為丸如桐子大每服十數丸溫酒

下

乾地黄散

出千金方

治骨折筋斷傷疼痛者

乾地黄

當歸

羌活

一方用獨活

苦參

各等分

右咬咀每服七錢白水煎服或為末酒調下

海桐皮散

出聖惠方

治傷折辟外生風疼痛

海桐皮剉

黑豆

炒熟

附子

炮裂去皮臍各一兩

防風

二兩

去蘆  
頭

右為細末每服以溫酒調下二錢日三四服

治傷折疼痛不可忍

出聖惠方

當歸

一兩半

白芷

桂心

吳茱萸

各一兩

右為細末剉生龜一枚入藥擣令勻用封裹傷折處

至聖黑龍丹

出御藥院方

治一切筋骨損傷疼痛

米粉

四兩於銀器內炒成塊子黃色放冷研為極細末後入二味

乳香

細研

沒藥

研細各半兩

右研極細每用以好酒或醋調如膏攤在紙上貼患處

紫金散

京三棱

剉炒  
黑色

連翹

半兩

黃耆

三錢

甘草

炙三錢

羌活

半兩

右為麤末作一服水一盞煎去渣食後服

飲蛇龜酒

出聖  
惠方

治一切筋骨肌肉折傷疼痛

飲蛇龜

一枝

糯米

五升蒸  
作釀飯

好酒

二斗



右剉龜釀飯同入酒甕中封七日即好每煖一盞服之

雙靈膏

出御藥院方

治一切筋骨肌肉疼痛

良薑

一兩炒剉

白芥子

半兩微炒

右為細末每用藥二錢半頭白麴半兩水調成膏攤在紙花上貼患處

沒藥散

出聖濟總錄

治墜折傷損疼痛不可忍者

沒藥

研別

乳香

研別

元胡索

當歸

切焙

甜瓜子

各一  
兩 丹砂  
研半兩

右為細散拌勻每服一錢熱酒調下又取藥散二三錢以黃米作粥攤作餅子摻散藥在上用貼患處以帛封札定一二日換佳

治折骨傷筋痛不可忍

出經驗良方

生地黃 藏薑瓜蒌糟各一斤 赤小豆半升 生薑

六兩

右研爛同炒勻令熱以布帛裹罨傷處用杉板夾縛

不過三日令安

聖靈丹

出御藥院方

治一切打撲傷損及折傷疼痛不可

忍者

乳香

五錢

烏梅

五箇去核

白米

一捻

萵苣子

大盞炒黃取用

二兩  
八錢

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一九細嚼熱酒下如痛再服一方米湯送下病在上食後服在下食前服

托裏止痛散

黃耆

白茯苓

各一兩

甘草

半兩

乳香

一錢別研

右為細末每服二錢酒半盞慢火煎成膏子再入酒一盞調勻溫服

蓬莪散 治撲傷疼痛

白殭蠶

炒一兩

蘇枋木

剉二兩

沒藥

研半兩

右麤搗篩每服一錢水一盞煎至七分去滓溫服日三服若為細末熱酒調下亦得一方無沒藥

烏梅煎

出肘後方

治傷折疼痛墜仆瘀血方

用烏梅五升去核以飴糖五升煮稍稍食之自消一

方烏梅煎湯調百草霜服

又方

取白茅根葉搗絞取汁三升服之不過三四服愈冬

用根

太獄活丹

出和濟

治男子婦人外傷內損狗傷蟲咬車

馬撲墜手足折傷一切疼痛腹中瘀血刺脇築心左

癰右瘕走注疼痛癰疽痔漏及婦人冷氣入腹血脈不通產後敗血灌注四肢及吹奶腫痛血氣撮痛病宜服之

花桑枝

如臂大者燒灰盡  
滓米泔中焙乾

栗楔

栗薊中心扁者  
薄片日乾各一

斤

細墨

半斤一半用蓖麻子三兩細研塗墨上  
盡黃紙包泥固濟乾炭火五十七斤燒

赤冷地上出火兩時一半用醋  
化硃砂塗墨上火炙令乾燥

皂角刺

一斤燒  
赤滓醋

中炙

大黑豆

一斤濕布揩去  
垢黑皮焙乾

亂髮

二斤皂角  
水洗淨用

清油二斤炒頃揔  
看色即止為末

乳香

四兩通明者乳鉢細  
研入米醋一椀熬熟

硃砂

三兩洗淨者  
醋化塗墨上

右為末拌令勻杵二三千下丸如彈子大醋糊丸重者一丸輕者半丸以無灰酒一盞乳香一豆大先磨乳香次磨藥盡煎三五沸臨卧溫服以痛處就牀欲汗則被覆仍用藥塗傷處切忌一切動風物婦人服入當歸末一錢孕婦勿服一方無硃砂

治折傷 取括蕒根搗爛以布裏之熱除痛即止

熟乾地黃丸

出聖濟  
總錄

治遠年傷折忽因血氣不和舊

傷處疼痛難忍

熟地黄

焙乾四兩

杏仁

湯浸去皮尖并雙仁

牛膝

去苗酒浸焙各一兩

五錢

苦參

細剉焙乾

菟絲子

酒浸焙乾

肉蓯蓉

酒浸切焙

草薢

炒各一兩

桂皮

去粗

青木香

生用各一分

訶梨勒

煨熟去核半兩

升麻

三分

右除杏仁外搗細為末入杏仁別搗再羅勻煉蜜和搗三千下丸如梧桐子大每服空心溫酒下二十九至三十丸



治折傷

以水獺一箇用罐子內以泥固濟放乾燒灰為末以黃米煮粥於傷折處攤以水獺末一錢上摻使用帛子繫裏立止疼痛

治折傷止痛化血

出本草

取能

奴來

生搗其肉及血傅之

能即三足鼈也

治傷折筋骨生肌破血

出本草

用每始王木酒水煮濃汁飲之

治折傷先用止痛湯法

出本草

搗白礬為末每用一匙匕湯沸一椀衝了以手拍蘸乘熱熨傷處以時止然後排整筋骨貼藥

治斷指

出本草

以蛇含草膏封之抱朴子云連已斷之骨

治刀傷及折傷

出朱氏集驗方

右用烏狗血和酒連喫數椀蓋犬血能散惡血也准西總管李貴見効邕莞易倅因會客於南樓墜樓者

二十餘人亦用此救之見功

治折傷

用恭

甜音

菜搗傅之

傷折惡血不散

附論

夫脈者血之府血行脈中貫於肉理環週一身因其肌體外固經絡內通乃能流注不失其常若因傷折內動經絡血行之道不得宣通瘀積則為腫為痛治宜除去惡瘀使氣血流通則可以傷完也

方

牛黃散 治大損後化惡血理好血止疼痛

牛黃

細研

真珠

細研

龍腦

細研各一分

琥珀

牡蠣

燒為粉

硃砂

細研水飛過

桂心

當歸

剉微炒

蒲黃

各一兩

麝香

細研兩

金箔

銀箔

各五十片細研

右研令勻不拘時候以桃仁湯調下二錢

白殭蠶丸

治骨折筋傷後惡血攻疼痛不止

白殭蠶

炒 當歸

桂心

補骨脂

神麴

炒黃

半夏

湯泡七遍去滑

檳榔

赤芍藥

各一兩

芎藭

薯蕷

炒黃

白附子

炮

芫花

醋拌炒各半兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服以溫酒下二十九日三服

黃耆散 治傷折惡血凝滯腫痛

黃耆 芍藥 生乾地黃

焙

附子

炮

當歸

切焙

續斷

桂

去皮各半兩

乾薑

炮

大黃

生各一兩

椒

去目并閉口炒出汗

右剉如麻豆每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

芍藥散 治打撲筋骨惡血不散迷悶疼痛小便血下

一名當歸散

赤芍藥

當歸

剉微炒

續斷

白芷

生乾地黄

黃芩

甘草

炙微炒剉

牛膝

去苗

蒲黃

各一兩

右為細末不拘時候以溫酒調下二錢一方無蒲黃

芍藥湯 治傷折惡血不散腫痛不消

赤芍藥

黃芪

附子

炮裂去皮臍

當歸

切焙

續斷

肉

桂

去粗皮

羌活

去蘆頭

蜀椒

去目并開口者各一兩

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

芎藭湯

治傷折腫痛氣血不散

芎藭

甘草

炙剉

蜀椒

去目并開口者炒出汗

澤蘭

附

子

炮裂去皮臍

桂

去皮各一兩

當歸

切焙

大黃

醋炒各半兩

右為散每服三錢溫酒調下不拘時候

蒲黃散 治骨折筋傷惡血攻心煩悶

蒲黃

三分

芎藭

當歸

剉微炒

桂心

各半兩

白芷

細辛

各一兩

右為細末每服以生薑酒調下二錢日三四服

草烏頭膏

一名烏頭膏

治傷折惡血結滯不散腫痛

方見諸骨

跌蹉類

桃仁散

治從高墜下及落車馬胷腹中有惡血喘息

不得



川大黃

劉碎微炒

川硝石

甘草

炙微赤劉各一兩

蒲黃

一兩半

桃仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右為散每服四錢以水一盞入棗二枚煎至六分去

滓不拘時候溫服

芎藭湯

治傷折惡血瘀結不散

方見傷折腹中瘀血類一名桂藭湯

蒲黃鯉魚散

治車馬墜撲傷折惡血衝心迷悶

蒲黃

二兩

鯉魚鱗

五兩炒灰

芸臺子

一兩末

生地黄

汁合五

右先將蒲黃芸臺子於盆內以慢火炒旋滴地黃汁於內炒令汁盡以乾為度并鯉魚鱗灰一時研為末不拘時候以童子熱小便調下二錢

杉木節散 治從高墜損心胃惡血不散

杉木節

七箇細剉

蘇枋木

五兩細剉以水一斗煎取五升去滓

醋五合

入於蘇枋木汁內

右將杉木節於一砂盆內以慢火炒旋滴蘇枋木醋汁相和炒令汁盡停冷搗為細末每服以童子小便

調下二錢日三四服化去惡血為効

蠶沙膏 治傷折惡血不散

原蠶沙

二升炒研

麥麴

三升

右和勻以米醋四升煮稠磁器內盛量損處多少以絹帛裹日再易

糟米塗方 治傷折惡血不散疼痛

酒糟

二升

糯米

半升

右同和酒煮稠得所取出乘溫塗患處外封裏之日

再易

地黄膏

出聖濟總錄

治傷折惡血結滯腫痛

生地黄

細切三斤

烏雞

一隻去毛腸肚并足和骨細研

右用和搗一二千杵量患處多少攤帛上縛之日再

易

外塗散膏

出聖濟總錄

治傷折惡血瘀滯不散

鼠糞

三兩燒存性

生地黄

半斤切焙

右為末猪脂油和塗患處日三易

治血久不除變成膿方

大黃

如雞子一枚

蚯蚓屎合

右以酒半升煮三沸服之

虎杖散 治筋骨傷損腹中疼痛瘀血不行

虎杖

剉二兩

赤芍藥

剉一兩

右為細末每服三錢溫酒調下不拘時候

神效熨方

出十便良方

療從高墜下被木石所竿或因落

馬傷損血瘀凝聚氣急欲絕損腫疼痛者

以淨土五升蒸之令熱分半以故布數層裹之熨病  
上勿令大熱恐破肉冷易之以痛止即已凡有損傷  
者皆以藥法治之神効已死不能言者亦活三十年  
者亦瘥一方和醋蒸熟封裏所傷處

治惡血不除被打撲瘀血在骨節及脇外不去

以鐵一斤酒三升煮取一升服之或燒赤投酒服之

治血聚皮不破者

出百一  
選方

用蘿蔔葉研細罨以絹帛包縛傷處

治因傷損血瘀不散

出肘後方

取牡丹皮八分合豆蟲二十一枚熬過同為末每旦溫酒和服寸匕血當化為水下

松節散

出聖惠方

治從高墜損惡血攻心胸膈煩悶

用黃松木節五兩細研童子小便五合醋五合於砂盆內慢火炒旋滴小便醋以盡為度炒令乾搗細為散每服以童子熱小便調下二錢日三四服

甘草湯

治諸傷惡血積滯腸中

甘草炙

白茯苓

去黑皮

肉桂

去粗皮

杏仁

去皮尖雙

仁各一兩

右麤搗篩每服三錢水一鍾煎至七分去滓溫服不

拘時候

治傷損瘀血不散疼痛

出聖惠方

蒲黃

兩四

附子

一兩炮裂去皮臍

右為細散不計時候以溫酒調下二錢

治傷折止痛散

出本草



用小麥粉和醋煮之裏傷處便定重者再蒸裏之甚良

治破傷血不止

出永類  
鈴方

真血竭

三錢或用番降  
節中油代亦可

五倍子一兩

陳紫蘇葉

三錢

白芷兩

海金沙一兩

右為細末糝之不可著水至效

治久血不除變膿者

出肘  
後方

大黃

三兩

杏仁 桃仁

各四  
十粒

右以酒水各五升分三服當下膿血止不盡更須服

傷折腹中瘀血附論

夫傷折腹中瘀血因高墜下倒仆擗撲氣血離經不得  
流散瘀在腹中速宜下之遲即日漸瘀滯使人枯燥色  
不潤澤則變瘦痺血瘕之病

方

澤蘭丸

出聖惠方

治諸傷折踣損蹉跌筋骨止疼痛散瘀

血

澤蘭

蒲黃

各一兩

赤芍藥

剉微炒

當歸

微炒

白

芷

芩薊

細辛

延胡索

牛膝

去苗

天雄

炮

皮

桃仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒黃

桂心

生乾地黄

續

斷

川大黃

半兩剉碎微炒

皂莢

去皮塗酥炙令焦去子別搗為末各一兩

右為末用酒醋各一升先將皂莢末煎成膏入藥末

和丸如梧桐子大不拘時候以溫酒下三十丸

通神散

出聖惠方

接骨續筋散瘀血止疼痛

木香

沒藥

當歸

微炒

生地黄

劉寄奴

桂

心 補骨脂炒 赤芍藥 桑根白皮 川大黃

劉微炒 黑豆二合 炒熟 敗龜塗酥炙微黃各一兩 羊脰骨五兩

燒令變赤入醋蘸如此七遍

右為細末不拘時候以溫酒調下一錢

敗蒲散出聖惠方 治傷折內損瘀血不散

敗蒲一兩半 燒灰 牡丹皮 當歸劉微炒 芎藭 赤

芍藥 生乾地黄 川朴硝 桃仁湯浸去皮尖雙仁麤炒微

黃 蒲黃兩 半兩湯浸去 陳橘皮白穰炒微黃

右為末每服四錢水一中盞煎至六分去滓不拘時

候

麒麟竭散

出聖惠方

治傷折內損血瘀不散

麒麟竭

牡丹皮

蒲黃

當歸

劉微炒

桂心

芎藭

赤芍藥

沒藥

骨碎補

各一兩

敗蒲

一兩

半燒  
灰

右為細末每服二錢以溫酒調下日三服

神麴丸

出聖惠方

治傷折內損血瘀不散

神麴

三兩搗碎醋少許拌炒微黃

虎脰骨

二兩塗酥炙微黃

海桐

皮剉

肉蓯蓉

酒浸一宿刮去皮炙

芎藭

半夏

湯浸七遍去滑

法製

紅藍花

各一兩

白殭蠶

三兩微炒

右為末煉蜜搗三二百杵丸如梧桐子大每服以溫酒下二十九日三服

蒲黃散

出聖惠方

治傷損腹中瘀血不欲聞人聲胃中氣

塞便利出血者

蒲黃

一兩

當歸

切焙

桂

去粗皮

續斷

白芷

各二兩

甘草

炙剉半兩

地黃

生用一兩

右為散空心酒調服一錢日再服一方有藕節二兩

當歸散

治傷折下瘀血

當歸

三分剉微炒

蒲黃

半兩

芸臺子

半兩

生薑汁

合

好酒

五合

生地黄汁

三合

膩粉

分

右為細末先煎生薑地黃汁并酒等三兩沸然後入藥味和調勻分為三服每日空心服之當轉下腹內惡血了便宜服補藥

琥珀散 接骨化瘀血

琥珀 生玳瑁 當歸 蒲黃 生乾地黄 京

三稜 煨剉各  
一兩

右為細末不拘時候以溫酒下二錢

買子木湯

出聖  
惠方

治瘀血聚於腹中不便服藥多有血

結顆塊衝心

買子木

當歸

剉微  
炒

桃仁

湯浸去皮尖雙仁  
麩炒微黃各一兩

紅雪

赤芍藥

各一  
兩半

東日桃枝

剉三兩



右為散每服四錢以水一盞入生薑半分煎至六分去滓溫服日三四服

麝蟲散

出聖惠方

治打損及傷墮腹內有瘀血

麝蟲

蛭蟲

水蛭各三十枝

桃仁

粒五十

桂心

去皮

二兩

大黃

五兩

右㕮咀以酒水各五升煮分五服

夜合枝散

出聖惠方

治馬墜有瘀血聚於腹胃之中不便

服藥多有擊血結成顆塊衝心

夜合枝剉

杏枝剉

甜瓜子各一兩

赤芍藥一兩

半

右為散每服五錢以水酒各大半盞煎至五分去滓

溫服日三四服

四聖散

出鮑氏方

治傷重煩悶欲死者用此打血利大便

小便

花藥石 黑神散 蒲黃散各貼 當歸 牛膝

川芎

米水炒

白芷

醋炒

蘇木

大黃

各半兩

蓮子

肉 酒煮  
半兩

右為末童子小便調服或木通湯下亦可惡血立下

麻布散

出聖惠方一  
名牡丹散

麻布

一尺  
燒灰

牡丹皮

淹蘭子

各一  
兩半

桂

去粗  
皮

當歸

切  
焙

鬼箭羽

敗蒲

燒  
灰

赤芍藥

各一  
兩

蒲

黃

半  
兩

大黃

剉炒  
三兩

右粗搗篩每服五錢以好酒一盞半煎至八分入芒

硝半錢更煎一沸去滓空心溫服

敗蒲湯

出聖濟總錄

治墜撲踉折瘀血疼痛

敗蒲

燒灰

當歸

各二兩

牡丹皮

芎藭

赤芍藥

各一兩

豉心

蒲黃

紙上炒半兩

陳橘皮

去白瓢一兩

桃仁

湯浸去皮尖雙仁半兩

右麤搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓入地黃

汁一合朴硝一錢溫服

桃枝湯

出聖惠方一名桃仁湯

療墮落積瘀血不散疼痛大小

便不通

桃枝

一握中拍長剉碎

芒硝

分五

大黃

兩四

當歸

甘

草

炙

桂心

兩各三

蜜蟲

二十枚去翅足熬

桃仁

五十枚去

皮

炙

水蛭

二十枚熬

川朴

硝半兩

右咬咀以水八升煮取三升去滓分三服內消忌海

藻松菜生葱等一方無朴硝桃枝

桃仁湯

出聖惠方一名荊芥飲子

治腹中瘀血在內痛滿短氣大

小便不通

桃仁

蟻蟲

二十枚去尖熬

水蛭

二十枚熬

川朴

硝半兩

桂心 當歸 甘草各二兩 蒲黃五兩

右㕮咀以水一斗煮取三升分三服瘀血在腹令人

瘦痺服此効

牡丹湯

出聖濟總錄

治因墜墮內損

牡丹皮

大黃

焙切

桂皮

去粗

鬼箭羽

朴硝

蒲黃 芍藥

當歸

切焙各一兩

右麤搗每服三錢水一盞煎至七分空心日午臥時

去滓溫服

檳榔散

出聖惠方

接筋骨通瘀血止疼痛

檳榔

劉寄奴

桑寄生

熟乾地黄

龜殼

酥

炙微黃各一兩

赤芍藥

當歸

剉微炒各三分

桃仁

湯浸去皮六雙

仁麩炒黃為度一兩

右為細末不拘時候以溫酒下二錢

理中膏 療墮落積瘀血主消血

大黃

二兩

猪脂

斤

桂心

一兩

乾薑

一兩

當歸

二兩

通草

亂髮

各一兩

右先以豬脂煎髮令消盡次搗各藥篩細一同攪勻  
微火煎之三上三下即藥成去滓以好酒服一兩日  
二服一方不去滓是生膏子

黃耆湯

出聖濟  
總錄

治因攤顛墜墮內損瘀血及吐血日

漸羸瘦

黃耆剉

甘草炙

當歸

切焙

芍藥

生薑

切焙  
各一

兩

右麤搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓服不拘



時候一方無生薑

桂芍湯

出聖濟總錄

治傷瘀血不行積在心腹

桂去粗皮

芍藥

荷葉蒂燒灰或用荷葉

淹蘭子大

黃剉碎

朴硝

別研各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至八分去渣溫服空

心日午臥時各一服

活血散

出聖濟總錄

治傷損瘀血在內攻心注刺痛

蝙蝠炙乾一枚

當歸切焙

骨碎補去毛

桂去粗皮

補

骨脂

微炒各半兩

大黃

剉炒三兩

右為散每服二錢空心溫酒調下薄荷湯下亦得

地黃酒

出聖濟總錄

治傷損瘀血在腹

生地黄升

酒升

桃仁

去皮尖雙仁炒

牡丹皮

桂

去粗皮各一兩

右以後三味搗羅為末與前二味一處煎每服去粗

溫飲一盞不拘時候

地黃湯

出聖濟總錄

治墜墮內損大小便下血經久不盡

兼瘀血不時吐唾出血

生地黄汁五兩

柏葉半兩

甘草炙半兩

黃芩去黑心一兩

阿膠炒一兩

右除地黄汁外為末每服三錢水一盞地黄汁三分同煎三五沸去渣通口服不拘時候

桃仁桂心湯出聖惠方

治打損瘀血在藏攻心煩悶

桃仁湯浸去皮尖雙仁

桂心 淹藺子各一兩

川大黃

二兩 荷葉蒂三七枝

右為散每服五錢水一大盞煎至五分入朴硝一分攪令勻空心分二服以利下惡血為度

荊芥散

出聖惠方

治傷折瘀血在內煩悶刺痛

荊芥

握一

淡竹葉

一雞子大

當歸

一兩剉微炒

地黃汁

合

右為末以水一大盞煎七分去滓入地黃汁食前為

二服

大黃散

出聖惠方

治打撲內傷瘀血在腹

大黃炒

當歸切焙

芎藭剉各半兩

右為散每服二錢空心日午臨臥溫酒調下

治有瘀血者銚方

其人喜忘不欲聞人聲胃中滿塞

短氣

甘草

兩

茯苓

二兩

杏仁

五十枚

右㕮咀以酒二升煮丸合為二服

蠶蟲散

治傷內損處腹中有瘀血疼痛煩悶

蠶蟲

一分微炒

牡丹皮

生乾地黄

各一兩

右為末每服於食前煖酒調下二錢

治打撲傷損聚血腹中不散煩悶

豉三 青竹茹一兩

右為散分三服以水一大盞煎五分去渣溫服日三

四

香豉散 治調諸傷損血在內

豉半斤 蘇木細剉一兩

右為散每服二錢溫酒下不拘時候

二黃散 治打損及傷墮腹內有瘀血久不消

大黃

一兩  
熬

生地黄

二兩  
熬

右以水酒二升煮頻服之或為末煉蜜為丸如梧桐子大每服十九酒下

桂枝酒 治打撲傷墜瘀血溷身遍體疼痛

以辣桂為末每二錢溫酒調下或用辣桂一分大黃丹桂各半分每三錢薑紫蘇煎服下黑物即安或未  
有藥倉卒且服米醋一小盞亦散瘀

桔梗散 治被打擊瘀血在腹內多不消散時發動者  
用桔梗末熟水下

玉質汗方

治折傷內損有瘀血天陰則疼痛兼婦人產後諸疾  
以三月採益母草一名重檐或名夏枯草揀去諸草  
及乾葉以新水淨洗於箔上攤晒令草乾盡則用手  
摘斷可長五寸許勿用刀即置鑊中量水兩石許可  
令草水深三二寸則縱火煎候草爛加水三分減二



分以上則漉去草取五六斗汁瀉入盆中澄半日以  
綿漚清汁於小釜中慢火煎取一斗許如稀餚每服  
取梨汁燒酒化下日再和美粥喫亦得如遠行不能  
將稀煎去即更煉令稠硬停作小丸服之七日內則  
疼痛漸瘳二七日平復或有產婦惡露不盡及血暈  
一兩服即瘥其藥兼療風益心力無所忌按本草質  
汗出西方色類玉凝血者入煎甘草松淚檉乳地黃  
并熱血盛之令以益母煎成故名玉質汗也

白馬蹄散 治傷折化瘀血為水

白馬蹄

三兩燒令烟盡

栗子黃

一兩陰乾

桂心三分

蒲黃

一兩

龜殼

三兩塗酥炙微黃

右為細末每服以溫酒調下二錢日三服

大黃丸 療被打有瘀血

大黃

二兩

桃仁

去皮尖熬

蜚蠊

去足翅熬各二十一枚

右搗以蜜為丸內酒一升中煎取七合服之

青竹茹散 療若為人所折舉身盡瘀血

刮青竹茹二斤

亂髮

如雞子大四枚燒灰

玄胡索二兩

右為散以水酒各一升煎三沸頻服日三四一方無

玄胡索

內消散 治打損內有瘀血不散疼痛

生銀

一兩搗碎細研

雄黃

細研

婆娑

研細各一分

右研勻不拘時候以溫酒調下半錢

玄胡索散 治車馬墜損瘀血不散攻刺疼痛

玄胡索

蒲黃

各一兩

肉桂

半兩去皺皮

右為細末每服用米泔半盞調下二錢日三四服  
療被打有瘀血方

薑葉

切一斤

當歸

三兩

右為末以酒服方寸匕日三服

蒲黃散 治被打傷破腹中有瘀血

蒲黃

一斤

當歸

桂心

各二兩

右搗篩以酒服方寸匕日三夜一

又方

劉寄奴 玄胡索 骨碎補

各三兩

右咬咀以水二升煎取七合復內酒及小便各一合熱令溫頻服一方菰宕子為末傳瘡上

法煉紅花散 治從高墜下所傷心下瘀血

以紅花一十兩以好醋二升浸二宿漉出火焙乾又入醋內又焙乾以醋盡為度焙乾為末每服用童子小便調下三錢日三服兼治婦人月水不勻產後諸疾血暈悶絕或狂語者并與二服便心胸爽利開眼

識人神効

白馬蹄散

出聖惠方

治打破腹中瘀血腹滿煩悶

用白馬蹄燒灰令烟盡搗篩酒服方寸七日三夜一

服

香豉湯

出肘後方

治被打毆擊損傷聚血腹中滿悶

用豉一升以水三升煮三沸分再服不瘥重作更取

麻子煮如豉法不瘥更煮豉如上法

又方

出海上名方

治被毆擊損傷聚血腹滿煩悶

用魚膠燒灰存性為末酒調一錢空心服

又方

用骨碎補為末酒調服一方研爛取汁以酒煎服滓  
傳損處尤佳數日平復及被箠捶身無全膚用之大  
効

水仙散

出聖  
惠方

治打撲墜損惡血攻心悶亂疼痛

用未展荷葉陰乾為末食前以童子熱小便一小盞  
調下三錢以利下惡血為度一方用乾荷葉五觔燒

令烟盡細研食前以童子熟小便一小盞調三錢匕  
日三夜一一方以童子小便和熟酒調服

治癰撲傷損瘀血流經絡間成痼疾

出經驗良方

用老黃茄種薄切瓦上焙乾為細末熟酒調下二錢  
日二服雖十餘年積亦蕩去矣

治被傷損瘀血不散方

出聖惠方

右用生地黃汁一中盞相和煎三五沸食前溫服

治撲損瘀血

出本草



用芥子和生薑研微暖塗貼

治折傷內損瘀血不止煩悶欲死者

出本草

用石藥酒磨服之

石藥似碎石  
硃砂之類

治撲損瘀血

出本草

用糟罨之

治打損瘀血

出本草

以飴糖熬令焦和酒服之

治撲損瘀血

出本草

以白樹皮酒漬之

治撲損傷折瘀血

出本  
草

用小麥麴醋炒貼

治消撲損瘀血

出本  
草

以菩薩石用水磨服之

治主蹠跌折傷瘀血

出本  
草

以羊脂塗上

治折傷損內瘀血生膚止痛

出本  
草

取廬藥以乳及水煮服之傳傷折處

治撲損瘀血

出本草

桑葉煎汁服之

治諸傷氣血膨脹大便不通肚腹築痛

出永類方

雄黃

膩粉

各三錢

巴豆

十粒五粒去油生用五粒油燒存性

真

蒲黃

錢一

右為末飯丸菴豆大每服十九冷茶下過一時未通用水邊烏柏根研汁下十五丸即通

治諸損傷

出永類  
鈴方

草藥健徑毛蛇藤存血瘀多一兩打破大青根半兩  
化氣矮樟柳半兩熟骨草半兩作葱七寸長七莖住  
痛多加紫金藤又加山甘草用一兩加薑三兩拌和  
牛膝根半兩消血瘀加用過路蜈蚣節過牆楓一兩  
松圓圓一兩左纏接骨一兩右生研酒浸開去滓加  
童便服體弱溫熱服有瘀血在內麻油葱同酒後用  
滓盒傷處皮破血不出用貼

六神丸

出楊氏家藏方

治打撲閃肭墜落車馬傷折筋骨瘀

血不出腹脹氣滿不得安卧

當歸

洗焙

沒藥

研

水蛭

燒焦

附子

炮

川烏頭

炒去皮臍已上五味各一兩

草烏

二枚炮去皮臍

右件並為末酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸加至五十丸溫酒鹽任下如傷折筋骨酒熬膏子調藥攤故帛上貼之

治卒血攻心被打內有瘀血

出本草

以人尿煎服之一升一服

治撲損瘀血暈絕及困乏皮膚破裂及蛇犬等咬

右並用熱尿淋患處

治濯瘀血

用麻青皮淋湯於損處濯洗瘀血即散  
麻皮乃今人績布麻種子

也

治打撲傷損瘀血疼痛

用自然銅味辛平以酒磨服散血止痛續筋  
自然銅出信州鉛山

縣銀場深坑中深處有銅鑛多年鑛氣結成似馬勃色紫而重食之味澀是自然銅也

治瘀血不散變成癰者

用生淹藺子

味苦溫

搗取汁一升服之

治打磕損心腹血瘀傷折筋骨疼痛金刃所傷不可忍者

用沒藥一味量病輕重溫酒服佳

傷折風腫

附論

凡肢節傷折皮肉破裂久而未合為外風所觸則令肌

肉受寒既不得收斂之與血氣相搏又不得消散之故  
內為風腫不散即便膿血敗壞也

方

沒藥散

出聖濟  
總錄

治傷折為風寒所侵風腫不消

沒藥

細研

當歸

焙切

芎藭

白芷

甘草

炙

椒

去目并閉  
口炒出汗

桂

去粗  
皮

附子

炮裂去  
皮臍

檳榔

生剉  
各半

兩

右為散每服二錢溫酒調下不拘時候



續斷湯

出聖濟總錄

治因傷折風冷所侵發為風腫疼痛

續斷

熟地黄焙

澤蘭葉

當歸切

芎藭

烏頭

炮裂去皮臍去

桂

去粗皮各一兩

右粗搗每服三錢水一盞煎七分去滓溫服不拘時

當歸湯

出聖濟總錄

治傷折皮肉破裂風毒內攻腫痛不

消

當歸

切

大黃

剉

白芷

防風

去

烏頭

炮裂去皮

臍各一兩

右搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘

時候

荊芥散

出聖濟總錄

治傷折風腫

荊芥穗

當歸

焙切

續斷

芎藭

剉各一兩

右為散每服三錢溫酒調下不拘時候

地黃散

出聖濟總錄

治傷折風冷所侵皮肉不合腫痛

熟乾地黃

焙

當歸

焙切

獨活

去薑頭各一兩

右為細末每服二錢溫酒調下不拘時候

黃蠟膏

出聖濟總錄

治傷折風腫疼痛

黃蠟

五兩

桂

去粗皮

吳茱萸

炒為末各一兩

鹽

一分燒

右搗羅三味為細末鎔黃蠟并麻油五兩與藥末同煎數沸攪勻傾出磁合收之每用看所傷大小攤貼頻易之

玉真散

出永類鈴方

治破傷風及打撲傷損

天南星

湯浸去皮臍

防風

去叉

右等分為末如破以藥貼瘡口上後以生薑自然汁

少許溫服調一錢如牙關緊急角弓反張用藥二錢以童子小便下或鬪打傷損以二錢溫酒調下傷重至死但心頭溫以童子小便調二錢灌下併三服可活

杏仁膏

出聖濟總錄

治傷折風腫

以杏仁湯浸去皮尖雙仁炒三兩細研如膏塗腫外以帛縛頻易之

大豆膏

出聖濟總錄

治傷折皮肉破裂風傷成腫及被打

擊頭眼青腫

以大豆略炒去皮不拘多少搗羅為末薑汁調如膏  
塗腫處頻易一方用水調塗

荊芥子塗方

出聖濟總錄

治傷折皮肉破裂腫痛

用芥子細研不拘多少釅醋調塗腫處頻易之

治諸風折傷損

出永類  
鈴方

乾薑

洗一兩半

殭蠶

生水洗二兩

木鼈

水洗去殼二兩

獨活

三兩

藁本

二兩

乳香

水浸半兩

沒藥

水浸一兩二味另研

撫

芍 製枳殼 赤芍藥 破故紙炒 川續斷酒浸

炒 黑牽牛 川山甲灰炒各二兩 白芷 肉桂

良薑 淨細辛 當歸酒浸 川牛膝酒浸焙各一兩 羌

活兩半 草烏去皮尖三兩半 蒼朮炒半斤 骨碎補炒去毛三

兩 海桐皮酒浸炒三兩 附子 川烏炮各一箇

後二味看虛實加右為末每藥味一斤用麴二兩酒  
水煮糊丸如桐子大每服二十九壯實加二十五丸  
有臂膊頭痛生葱薑酒細嚼吞下兩脇腰腿疼痛茴

香薑酒空心下脚膝腫痛木瓜薑酒下四五月加荊芥春月去破故紙夏月去牽牛

羌活飲

出聖濟總錄

治傷折損骨諸瘡腫者慎不可當風

臥濕及取涼若風濕所傷則發瘕口噤殺人若已中風覺頭項強直身中拘急

羌活

去薑頭一兩

竹瀝錢三

右將羌活粗搗篩以竹瀝同煎去滓分三服溫服若口噤者掘口灌之作竹瀝法可將十餘莖新竹青每

莖一尺五寸截斷用火炙逼中央使兩頭取其竹漚  
別作數束燒取汁亦可救急立驗

治諸風損傷折踈風順氣勻血住痛

出永類  
鈴方

當歸

一兩半

川芎

一兩

白芷

烏藥

木瓜

牛

膝

各一兩半

赤芍藥

牡丹皮

淨陳皮

細辛

玄胡索

炒

川續斷

茴香

炒

破故紙

炒

石

菖蒲

穿山甲

蚌粉

炒各一兩

交趾桂

錢

桃仁

炒去皮半兩

粉草

一兩

五加皮

二兩酒浸或加丁香皮

檳榔



剉

枳殼

製各一兩

右咬咀薑酒浸沒藥乳香各半兩加入或加老松節炒烏豆老薑煮酒服

當歸散

出永類  
鈴方

治諸風損傷折或作癰疽或因損中

風

澤蘭 當歸 牛膝 續斷各十兩 細辛 芍藥

白芷 川芎 肉桂各五兩 桔梗 甘草各四兩

川烏 川椒 白楊皮三兩或不用

右為細末酒調下

乳香散

出永類  
鈐方

治證同上

乾薑

肉桂

各三兩

牛膝

羌活

川芎

杜細

辛

薑黃

芍藥

草烏

川烏

各四兩

當歸

骨碎補

蒼朮

木鼈肉

各六兩

沒藥

五兩

何首

烏

十四兩

桔梗

十兩

乳香

半兩

赤小豆

升

白芷

海桐

各二兩不  
用亦可

右為細末酒調下

治諸損紅黑二散

出永類  
鈴方

當歸 川芎 白芷 陳皮 赤芍藥 茴香

牡丹皮 桂枝

各一兩

嫩松枝

蒸過  
去毛

當歸身

各四

兩

生地黄

三兩  
細末

草烏

酒醋  
炒

自然銅

酒醋  
淬各

兩

蒼朮

良薑

骨碎補

製各  
二兩

獨活

四兩

柘

木灰

松香

此藥加倍  
各作黑末

隨病重輕打和茴湯或薑蔥酒調常合和劑石南丸

兼服

又方出永類  
鈐方

草烏 細辛 羌活 獨活 白芷 牛膝 白

膠香 五靈脂 藁本 川芎 甘草 茴香

藿香 各三兩 石南藤 木瓜 自然銅 骨碎補

乾薑 當歸 肉桂 各等分

細末酒調用如傷重去石南藤加當歸脚傷重加木  
瓜手傷重加木鼈子腰傷重加茴香牽牛夏月減薑  
桂加百藥煎石南藤秋單接骨散薑黃骨碎補炒無

名異煖生地黃生薑各自然汁一兩為末酒調外用  
生薑瀨蝦蟇一箇研如泥敷貼

頭傷腦髓出附論

凡腦為物所擊傷破而髓骨出者治藥宜速蓋頭者諸  
陽所會腦者物所受命若腦破髓出稽於救治斃不旋  
踵宜速以藥封裏勿為邪所中調養榮衛安定精神庶  
幾可活若其證戴眼直視不能動者不可治

方

豚血灌方

出肘後方

治頭為物所擊腦破髓出悶絕但有

氣在心者

以豚子血一合如無豚子猪血亦得每用少許灌腦

中立醒

水銀方

出肘後方

治腦破髓出欲死宜服

以水銀二錢每用一錢許服之即活須臾未覺再服

大豆酒

出聖惠方

治頭破腦髓出中風口噤

以黑大豆一斗搗碎安甑上蒸之熟以酒一斗淋之

取汁每服一盞連三五服取汗為効

傷墮致損吐唾出血

附論

凡墮墜打撲內動心氣榮衛氣血不至為患多矣若暴損胃脇氣留肩膜損血入胃停積不去甚者效唾吐血治法當調其榮衛緩其中逐去損血

方

阿膠丸

出聖惠方

治從高墜下傷折踠損內傷五臟微者

唾血甚者吐血

阿膠

三兩搗碎  
炒令黃燥

肉蓯蓉

酒浸一宿刮  
去皺皮炙乾

川樹

目去

及閉口者  
微炒出汗

白芍藥

當歸

剉微炒

芍藥

玄胡

索

熟地黃

桂心

川大黃

剉碎  
微炒

黃耆

剉以  
上各

一兩

艾葉

一兩半  
微炒

牡丹皮

附子

炮裂去皮  
臍各一兩

牛膝

去苗  
一兩

右為末先用酒一升煎三五沸將一半藥末入酒內

調麴糊以慢火煎令稠入餘藥末和搗三二百杵丸

如桐子大每服以豆淋酒下三十九日三四服



雞蘇湯

出聖濟總錄

治墜馬跌損內傷吐血暴熱背上煩

熱心中欲吐喉內先覺血腥氣者

雞蘇

二兩半

地黃汁

合

桑根白皮

剉一兩

生薑

五合

葛根

剉

小薊根

切

淡竹茹

各二兩

右除生薑地黃汁外麤搗篩每服五錢以水一盞半

煎取一盞去滓入地黃生薑汁各半合更煎三五沸

去滓溫服每食後一服

消血散

出聖濟總錄

治從高墜下內損吐血兼腹中

瘀血

蒲黃

當歸

焙切

乾薑

炮

桂

去粗皮  
各一兩

蜜蟲

去足

翅炒  
一分

大黃

蒸坐一  
兩半

右為散每服三錢溫酒調下不拘時候

阿膠湯

出聖濟  
總錄

治傷折血滯在內吐唾中血出不止

阿膠

炙令  
燥

熟乾地黄

焙

赤芍藥

當歸

焙切

芎藭

各一  
兩

乾薑

炮半  
兩

右麤搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不

拘時候

艾葉湯

一名艾葉散  
出聖惠方

治墜隔顛撲內傷臟氣吐唾出

血甚者吐血及金瘡傷經血不止

艾葉

炒半兩

白芍藥

三分

熟乾地黄

焙一兩

乾薑

炮半兩

阿膠

炙令燥一兩

甘草

炙一分

右麤搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不

拘時候一方有竹茹三分

蒲黃湯

出聖濟總錄

治打撲一切損傷血瘀時吐唾中出

血

蒲黃

二兩

當歸

切焙

桂

去粗皮

人參

檳榔

右為細散每服三錢溫酒調下不拘時候

加味芎藭湯

出醫方大成

治打撲傷損敗血流入胃脘嘔

吐黑血或如豆汁因墜墮閃肭致傷五臟損裂出血  
停留胃脘臟熱則吐鮮血臟寒則吐瘀血此各內傷

川芎

當歸

白芍藥

百合

水浸半日

荊芥穗

各等

分

右剉為散每服四錢水一盞酒半盞煎七分去滓溫

服不拘時候

甘草湯

出聖濟總錄

治墜撲傷損肺氣咳唾出血

甘草

一兩炙

白茯苓

去黑皮一兩

人參

一兩

杏仁

湯浸

去皮尖雙仁

炒研三分

右除杏仁外粗搗入杏仁拌勻每服三錢水一盞煎

至七分去滓溫服不拘時候

桂心湯

出聖濟總錄

治墜墮內損吐血兼腹中瘀血

桂去粗皮

當歸

切焙

蒲黃

各一兩

大黃

切焙半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分臨熟入地黃汁少許攪勻去查溫服不拘時候一方用淡竹葉切

代竹茹

黑神散

出朱氏集驗方

治傷損大吐血或因醉飽低頭掬損

吐血至多并血妄行鼻口俱出但聲未失者無不有

効

百草霜

蚌粉各等分

右為末每服一二錢糯米飲調下側柏枝研汁尤効  
速鼻衄搐一字皮破灸瘡出血舌上出血乾摻之

治墜損傷內或時吐血心煩疼痛出聖惠方

蒲黃一兩 生地黃四兩

右將生地黃入童子小便三合爛研絞汁於銀器中  
入蒲黃相和慢火煎一兩沸分為三服食前服之

胡粉散

出肘後方

治從高墜下吐唾出血面青氣短及瘀

血搶心

以胡粉一兩研細每服一錢溫水或酒調下

治墜落車馬間心腹積血唾吐無數方

出聖惠方

取乾藕根為末以酒服方寸七日三服如無取新藕

汁服藕根即節

治從高墜下傷折疼痛煩悶啼叫不得眠卧方及跣折

四肢骨破或筋傷蹉跌方

出聖惠方

取鼠屎燒為灰細研以豬脂和塗痛上即以物急裹之搗地黃一把須以酒漬之稍稍飲之即愈



黃芪湯

出楊氏集驗方

治傷損大吐血或因酒食醉飽低頭

掬損吐血至多并血妄行口鼻俱出但聲不失無有

不効

枳實

三十個炒為末

黃芪

二兩

甘草

半兩

紅棗

三十個同枳實

末搗爛慢火焙焦黃色

右為末用米飲調下二錢食後服

治墮損筋骨蹉跌碎破

出本草

取生地黄熨熱裏三日夜數易若血聚以針決之

杏枝酒

出聖  
愈方

治隋傷及墜馬撲損瘀血在內煩悶

以杏枝一握水一大升煮半升酒三合分再服大効  
其實不可多食傷神損筋骨一方取東引杏枝三兩  
細剉微熬好酒二升煎十餘沸去滓溫服分二次如  
人行二三里再服

諸骨蹉跌

附論

凡墜墮擗撲骨節閃脫不得入臼遂致蹉跌者急須以  
手揣搦還復關紐次用藥調養使骨正筋柔榮衛氣血

皆不失常度加以封裏膏摩乃其法也

當歸膏

出聖濟總錄

治骨出白蹉跌不復疼痛

當歸

洗切焙

續斷

剉

細辛

去苗葉

木通

剉一作通草

白芷

芎藭

剉

甘草

剉

蜀椒

去目及閉口者

牛

膝

去苗

附子

去皮臍生切各一兩

右粗搗用猪脂半斤先煎取油次下諸藥煎如膏以

絹絞去滓磁合盛每用少許抹損處熱手摩之

地黃散

出聖濟總錄

治諸骨蹉跌補絕傷

生地黃

焙

桂

去粗皮

乾薑

炮

芎藭

甘草

剉

當歸

切炒

芍藥

各一兩

右為細散每服二錢溫酒下不拘時候

烏頭膏

出聖濟總錄

治諸骨蹉跌脫臼疼痛兼傷折惡血

結滯腫痛

草烏頭

去皮尖微炒

細辛

去苗葉

獨活

去薑切

蛇床

子

炮各半兩

吳茱萸

炒半兩

葱

二十莖

生薑

四兩

右搗篩前五味為末次將生薑葱二味細研後入藥

末同和勻令垂濕攤絹帛上裏傷處日一易

羊腦膏

出千金方

治四肢骨碎筋傷蹉跌

羊腦

兩

髮灰

胡粉

胡桃脂

各半兩

右搗和調如膏傅上生布裏

大豆湯

出聖濟總錄

治諸骨蹉跌

大豆

炒去皮

大黃

炮

生乾地黄

焙

桂

去粗皮各一兩

右粗搗篩每服三錢酒水共一盞煎至七分去滓溫

服不拘時候

大黃散

出聖濟總錄

治諸骨蹉跌血瘀腫痛

大黃

蒸切

大豆

炒去皮各二兩

桂

去粗皮一兩

右為細散每服二錢溫酒調下日三服忌生葱

地黃傳方

出聖濟總錄

治骨節蹉跌內傷疼痛

生地黃

二斤洗研

芥菜子

四兩研

右細研和勻入酥四兩同煎服乘熱敷損處或以帛

子繫之日一易

療跣折四肢骨碎破及筋傷蹉跌方

出本草

右搗大豆末合猪脂和塗之乾即易之

治呵欠頰骨蹉開張不合方

出千金方

一人以手指牽其頤漸推之則復入矣推當疾出其指恐誤嚙傷人指也

治呵欠頰骨蹉方

出千金方

右銷蠟和水傳之

治筋骨閃痛方

以麴麴炒熱盛布袋熨患處瘥

沒藥膏

出御藥院方

治筋骨閃肭疼痛

沒藥

乳香研

虎骨

酥炙各半兩

吳茱萸

白芥

子

白芨

白薇

米粉

各一兩

生薑汁

酒各五

合

右為細末生薑汁并酒同煎至七合旋入藥末調勻  
垂熟攤紙上敷貼痛處一日一換用綿裹護

鯪魚甲骨貼燭膏

出御藥院方

治閃肭疼痛

桂去粗皮

當歸

切焙各一兩

麝一匙

秤九兩

鯪魚甲



醋塗灸  
三兩

附子生去皮  
臍一兩

生薑汁 生地黄汁

右除汁外搗為細末將地黃汁生薑汁各拌和勻暖酒調藥如膏攤於軟紙上乘熱敷貼患處用綿繫之  
每日一換

乳香丸 治閃肭脚氣疼痛等病

白膠香

四兩  
為末

草烏

二兩

赤小豆

半斤

白芍藥

二兩

木鼈子

三兩

加乳香沒藥

各二兩

右為細末醋糊和丸如梧桐子大每服三四丸溫酒

任下或木瓜湯亦可隨病服

松節散

出御藥院方

治閃撲筋骨腫痛

松節

桑白皮

蠶沙

香附子

朴硝

各等分

右為粗末每用藥一兩水一椀半煎至一椀熱濯痛處

輕體丸 治一切閃肭筋骨疼痛並宜服之

乳香

沒藥

各一兩

草烏

山梔子

芍藥

各二兩

右為細末用酒麴糊丸如梧桐子大每服十九溫冷

酒送下

生熟地黃散 治閃肭腫痛

生地黃 熟地黃 桂 白芷

右等分為末酒調服

紫金膏 治腿脚閃肭

紫金皮

六兩

乳香

一兩

木鼈子

十箇

麝香

少許

右細末生薑自然汁調成膏攤紙上貼患處

應痛散

出傳信  
通用方

治身體徧痛無力主宣通經絡使血

氣和暢

延胡索炒

當歸去蘆

桂去皮各等分

右為細末以酒調下不拘時候每服三錢或四五錢  
量病如何用藥多少頻進些酒亦隨人量以醉為度  
尋常閃著筋力挫氣疼痛一服即効

壯骨丹 治肋閃筋脈無力不能立者並宜服之

赤麴 芸香各二兩

右為末酒糊為丸如梧桐子大每服三四十丸用酒

任下

杜仲散 治一切諸氣閃肭腰脚不能轉側

杜仲

二兩去粗皮剉碎生薑自然汁浸一宿慢火炒

時蘿

一兩微炒

右為細末每服二錢溫酒調服閃肭氣痛陳皮湯下  
心氣脾疼懷薑湯下婦人血氣艾醋湯下小腸氣茴  
香湯下

沈香丸

出聖惠方

治踠折損傷落馬墜車蹉跌筋骨俱碎

黯腫疼痛煩悶宜服補筋骨益精髓通血脈止疼痛

沈香

一兩

肉蓯蓉

一兩酒浸一宿刮去皺皮炙乾

牛膝

一兩去苗

當歸

一兩剉微炒

虎脰骨

二兩塗酥炙令黃

栗子

去殼炒令黃二

兩

木香

一兩

骨碎補

附子

炮裂去皮臍

脰臍

酒刷微炙各一兩

甘草

一分微炙赤剉

續斷

一兩半

熟乾地

黃獨活

白芷

黃耆

剉

桃仁

湯浸去皮尖及雙仁麤炒

黃牡丹

敗龜

塗酥炙微黃

劉寄奴

川大黃

剉碎

微炒各一兩

右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不拘

時候以溫酒下三十丸

黑散子

出聖濟總錄

治踈折筋骨疼痛

香墨

半兩火煨  
淬三遍

烏頭

燒灰  
存性

芎藭

敗龜

醋炙  
各一

兩

赤芍藥

酒浸  
焙剉

沒藥

研

自然銅

火煨醋  
淬七遍

地龍

去土  
炒

乳香

研

當歸

切片酒  
浸焙

骨碎補

桂

去粗  
皮

白芷

各一  
兩半

右為散每服二錢熱薑酒調下不拘時候

乳香膏

出聖濟  
總錄

乳香

三兩

沒藥

三兩二味

剉如皂子大用生絹袋盛黃米內蒸如膠候冷別研

銅錢

四十九文火煨醋淬數遍搗末

蜜陀僧

雄黃

各半兩

甜

瓜子

當歸

切焙

骨碎補

虎骨

酥炙

黑狗頭骨

牛骨

人骨

木鼈子

麒麟竭

各一分

右為末拌勻入絹袋子內蒸如餲以磁器內盛如有傷折者旋取丸如豌豆大每服二十九溫酒下

琥珀丸

出聖惠方

治傷折踈損及理血補骨髓

琥珀

一兩

鼈甲

一兩塗酥炙令黃去羣欄

牛膝

三分去苗

白芍



藥三

白茯苓

三分微炒去刺

淹蘭子

三分

鹿茸

三分去毛

塗酥炙  
微黃

川大黃

三兩剉碎微炒

當歸

一兩剉微炒

黃耆

剉一兩

附子

三分炮裂去皮臍

桂心

三分

右為末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大不拘時候以溫酒送下三十丸

黃耆散

出聖惠方

治踠折筋骨傷碎瘀腫疼痛

黃耆

芍藥

各三兩

當歸

乾地黄

通草

各二兩

大黃

一兩

桂心

附子

續斷

乾薑

各二兩

蜀樹合 烏頭半兩

右治下節食前酒服五分日三服千金翼無大黃

芍藥散

出聖濟總錄

治跽折疼痛

赤芍藥

黃耆

剉各二兩

附子

炮裂去皮臍去

當歸

切焙

續斷

桂去粗皮

羌活

去蘆頭

虎骨

酥炙

蜀椒

去目并閉口炒出汗

大黃

生各一兩

烏頭

炮裂去皮臍半兩

右為散每服二錢溫酒調下不拘時候一方無大黃

延胡索散

出聖惠方

治跽折筋骨疼痛

延胡索 橘子仁 蒲黃 芸臺子 當歸切

虎脰骨 酥炙各一兩 桂 去粗皮半兩 牽牛子 生一分一半炒

右為散每服二錢溫酒調下不拘時候

沒藥散 一名虎骨散出楊氏家藏方

治閃肭折傷及風濕客搏筋

骨疼痛

沒藥 研 麒麟竭 丁香 炒 虎脰骨 酥炙各半兩

乳香 一分別研 骨碎補 一兩 桑根白皮 剉焙 赤小豆

各二兩

右為散每服二錢熱酒調下一法蘇木當歸酒調下  
空心臨臥乘熱服

骨碎補散

出聖濟總錄

治跣折手足熱腫疼痛

骨碎補

毛去

當歸

焙切

芎藭

剉

桂

去粗皮

蒲黃

蜀椒

去目并閉口炒出汗各一兩

澤蘭葉

沒藥

研各一兩

右為散每服二錢溫酒調下不拘時

槐子膏

療折跣傷筋骨

槐子中仁

秦朮

白朮

續斷

各一兩

桂心

淨去皮

巴豆十枚去皮  
心熬出油

大附子一枚  
炒

右咬咀以醇酒苦酒漬一宿以煉成猪脂二斤同煎  
三上三下候膏成絞去滓溫酒服杏子許一枚日三  
并塗傳忌葱冷水蘆筍桃李豬雀肉物

止血散出聖  
惠方

乾蝙蝠三枚  
燒灰

代赭一兩燒  
令紫色

頭髮三兩  
燒灰

紅藍

花一兩入鹽一  
分炒令黃

蝟皮一兩半  
燒灰

右為細末傳瘡上其血立止

青金散

出聖濟總錄

治踠傷骨折

生龍腦

別研

麝香

別研各一兩

丁香炒為

虎脰骨

白者燒灰各一兩

鮫鯉甲

燒灰二兩

右將鮫鯉甲虎脰骨灰丁香末同研極細次下龍腦

麝香和研令勻磁合盛每服半錢用小黃米一合煮

粥入醋少許攪勻下藥又取藥隨所傷多少用帛子

攤裏經宿一換

接骨膏

出聖惠方

治踠折傷筋骨疼痛不可忍

獼猴項骨

二兩

水獺骨

一兩

貓兒項骨

二兩

龜殼

二兩

右細搗入瓶子內不得透氣燒為灰碾為末入脰肭  
臍末半兩每用二錢以小黃米粥相和攤在油單紙  
上裏傷折處一日一易

三灰散

出聖惠方

治傷折骨碎割刺皮肉有瘡出血不止

茅根灰

三兩

牛皮膠灰

二兩

麻糝灰

二兩

右為細末傅瘡口上止血

大黃散

出聖惠方

治踈折瘀血

桃仁

四十枚

亂髮

握一

大黃

如指節大一枚

右以布方廣四寸以繞亂髮燒之吹咀桃仁大黃以酒三升煮取一升盡服血盡出或作米酒調服 肘後云仲景方用大黃三兩緋帛子如手灰亂髮如雞子大灰又用炊單布方一尺灰桃仁四十九枚敗蒲蓆一握長三寸切甘草一根如指大以童子小便量多少煎湯成內酒一大盞次下大黃分溫為三服別



剉敗蒲席半兩煎湯以浴衣被重覆服藥通利數行  
痛楚立瘥利及浴水赤勿怪即瘀血

又方

出聖  
愈方

桃仁

六十  
枚

大黃

六  
兩

桂心

二  
兩

右㕮咀以酒六升煮三升分三服當下血瘥或為細  
末以酒調服

夢授方

出聖  
愈方

治踈折傷筋損骨疼痛不可忍

生地黄

一斤  
切

生薑

四兩  
切

臧瓜薑糟斤

右都炒令勻熟以布裹罨傷折處冷則易之曾有人傷折宜用生龜尋捕一龜將殺患人忽夢見龜告言曰勿相害吾有奇方可療於夢中授得此方

又方

出肘後方

治踠折瘀血在腹久不消時時發動者

蒲黃

一斤

當歸

二兩

右治下篩食前酒服方寸匕日三

治踠折瘀血及久宿血在諸骨節及外不去時

出千金方

蜜蟲

二十枚

牡丹

一兩

右治下篩酒服方寸匕血化為水備急方云治久宿  
血在諸骨節

萵苣散

出聖濟  
總錄

治䟽折疼痛不可忍

萵苣子

一兩黑  
色者炒

乳香

半兩  
研

右為細末每服二錢熟酒調下不拘時服訖向痛處  
卧

白礬湯熨方

出十便  
良方

治䟽折先用止痛

以白礬一味為細末每用一匙沸湯一椀泡化以手

帕子蘸黍熟熨傷處少許痛定排整筋骨次用貼藥

雄鼠糞

尖者是

桂

去粗皮為末

右等分研勻量傷折大小以冷水調藥末攤軟帛上裏之須臾如火暖三日後損處極痒是筋骨生長切不可搖動搔抓其藥力常如火暖一兩日後覺藥力不暖即換新藥裏之

麻根汁酒方

出聖惠方

治跣折骨損痛不可忍煎打撲損

傷或墜墮瘀血腹滿氣短者

以大麻根及葉搗取汁飲一升無生麻酒煮乾麻汁服或溫酒服

地黃膏

出聖惠方

治踠折四肢及骨碎筋傷蹉跌不歸白

疼痛

以地黃不限多少熟搗用敷所傷損處或熬之以裏傷處以竹片夾裏又遍縛令急勿轉動一日可十易三日瘥若血聚在所傷處以刀子破出血一方用好醋熬乘熱攤於所傷處以帛繫定

鹿角散

出聖惠方

治四肢骨碎筋傷蹉跌或從高墮下被

重物頓斃得瘀血者

以鹿角不限多少用桑柴灰汁煮令微軟漉出曝乾  
搗羅為末以暖酒調下二錢日三服

治肋閃腰痛不能轉側

用神麴一塊如拳大燒通紅酒二大盞淬酒中覺酒  
溫便飲盡仰卧少頃取効

治踈折

出本草

以通草煮釀酒飲之

治閃肭及傷折

出本草

用葱白入鹽搗爛炒乘熱傅

治閃肭著

出百一選方

用米醋糟和平胃散罨患處一方用冷水調塗

治閃出白骨即拽入之後

出百一選方

以一色黃土及新蒲黃生薑同搗成泥罨損傷處日三四換之甚妙

治男子婦人閃著脚手

出本  
草

用羯羊糞燒灰為末用猪脂攪和搽痛處立効

治筋骨傷或被打瘀血在腹不消者

出千  
金方

以馬屎傳之或燒水煮熟傳一方用肥猪肉炙令熟

搗傷處

又方

出聖  
惠方

治跣折瘀血

取淹藺草汁飲之子亦可為末以酒調二錢日三四

服



又方

出千金方

凡被打及產後惡血及一切血瘀煮續筋骨木汁三升飲之

專治閃肭擔閃挫腰不可忍者不可行動者及治陰冷陽虛腰痛

破故紙

二兩

右瓦上炒香為末每服二錢酒調下不拘時一方酒浸一宿炒酒煮為丸仍用破故紙少許炒為末酒調

下

妙應散

出家藏  
經驗方

治閃肭動骨者

黃蘗

一片如  
掌大

草烏頭

兩

赤小豆

一合

右為細末以生薑自然汁調傳頻換勢退疼止為度  
此方的於謝守伯任渠云昨有僧因監修造撲損用  
此十數次遂安又有李享冲者溺水肭脚膝後漸愈  
而損處極熱微痛亟兩易之遂涼亦向安好僕亦屢  
試之

五白散

出楊氏家藏方

治打撲閃肭及風熱攻注一切腫痛

白芨

白芷

白殭蠶

炒去絲嘴

白芍藥

白薇


天南星

上六味各半兩

赤小豆

合

右件為細末以生薑汁調傳腫上乾即再傳



普濟方卷三百十一